



INFORMACIÓN SOBRE VACUNACIÓN INFANTIL PARA PADRES (2021)

Siguiendo las recomendaciones del Comité Asesor de Vacunas (CAV), perteneciente a la Asociación Española de Pediatría (AEP), realizado por el Grupo de Trabajo de Vacunas de APap Canarias

NIÑOS MENORES DE 1 AÑO

El Comité Asesor de Vacunas (CAV) perteneciente a la Asociación Española de Pediatría (AEP) en su última publicación de enero de 2021 sobre el calendario vacunal recomendado para la población pediátrica española, incluye dos vacunas que actualmente no están financiadas en nuestra Comunidad Autónoma.

1. Vacunas antirotavirus El rotavirus es el principal productor de diarrea en los primeros años de la vida y afecta, al menos una vez, a todos los niños menores de 5 años. Las vacunas disponibles han demostrado su seguridad y eficacia en niños a término y prematuros.

No hay datos de seguridad, inmunogenicidad o eficacia si se intercambian las 2 vacunas, por lo que se recomienda completar la pauta de administración con la misma vacuna.

Rotateq® Se administran por vía oral 3 dosis, a partir de las 6 semanas de vida, separadas como mínimo 4 semanas. La primera dosis debe administrarse antes de las 12 semanas de vida y la última antes de las 32 semanas.

Rotarix®: Se administran por vía oral 2 dosis, a partir de las 6 semanas de vida, separadas como mínimo de 4 semanas. La primera dosis debe administrarse preferiblemente antes de las 12 semanas de vida (en ficha técnica admite hasta la semana 20) y la última dosis debe administrarse antes de las 24 semanas.

2 Vacuna frente al Meningococo ACWY (Nimenrix®): En septiembre de 2017 se pone a disposición del público general la vacuna tetravalente frente a los serotipos A, C, W135 e Y del meningococo.

Como consecuencia de los cambios epidemiológicos observados en la enfermedad meningocócica invasora durante los últimos años en España, donde se constata un incremento significativo de los serogrupos W e Y predominantemente en menores de 1 año y adolescentes-adultos jóvenes, se aboga por el uso sistemático de la vacuna meningocócica tetravalente.

Se dispone de 3 vacunas que protegen frente a los serotipos A, C, W135 e Y del meningococo, pero Nimenrix® es, de momento, la única comercializada para administrar desde las 6 semanas de vida.

Según el inicio de la vacunación la pauta puede ser:

- < 6 meses: 2 dosis (2 meses- 4 meses) y el refuerzo a los 12 meses y 12 años (financiada desde 2019 a todos los adolescentes nacido a partir de enero 2007)
- 6 - 12 meses: 1 dosis a los 6 meses y el refuerzo a los 12 meses y 12 años.

Si usted quiere más información o administrar estas vacunas debe contactar con su pediatra/enfermer@ de pediatría. Puede consultar la información del Comité Asesor de Vacunas de la AEP en la siguiente página web: www.vacunasaep.org

