



NIRSEVIMAB

INFORMACIÓN PARA FAMILIAS



Septiembre
2023

El virus respiratorio sincitial (VRS) es el principal causante de infección respiratoria de vías bajas (bronquios) en niños menores de 5 años, especialmente durante los meses fríos, y es altamente contagioso.

En muchos de ellos, sobre todo en los menores de 2 años, puede causar **bronquiolitis** (inflamación de las vías respiratorias más finas que hay en los pulmones). Esta enfermedad produce inicialmente síntomas catarrales (tos, estornudos, mucosidad) y la mayoría de los casos son leves. Sin embargo, a veces puede llegar a ser muy grave, especialmente en bebés de menos de 6 meses de edad y recién nacidos, presentando dificultad para alimentarse y respirar, necesitando ingreso hospitalario, a veces en unidades de cuidados intensivos, incluso en niños previamente sanos.

Además, la infección por VRS en lactantes pequeños está relacionada con el padecimiento de problemas respiratorios a largo plazo (hiperreactividad bronquial / sibilancias recurrentes / broncoespasmos).

Desgraciadamente, no existe a día de hoy ningún tratamiento eficaz para esta enfermedad, por lo que es fundamental su prevención. Si bien el uso de mascarillas, el lavado de manos y el distanciamiento entre personas son medidas eficaces para prevenir los contagios, no son fáciles de cumplir para toda la población durante toda la temporada del VRS, especialmente para los lactantes que tengan hermanos menores de 5 años.

Actualmente tenemos a nuestra disposición un fármaco (nirsevimab) que es seguro y eficaz para proteger a los lactantes frente a este virus y prevenir los casos de bronquiolitis.

Las autoridades sanitarias y sociedades científicas pediátricas recomiendan la administración de nirsevimab a todos los lactantes menores de 6 meses y recién nacidos durante el periodo de máxima incidencia de bronquiolitis.

El nirsevimab se administra por vía intramuscular (como la mayoría de las vacunas), en una única dosis.

En Canarias se inmunizará, a partir de octubre de 2023, a todos los lactantes menores de 6 meses mediante la administración de una única dosis. Esta dosis se administrará en los hospitales tras el nacimiento a los bebés que nazcan durante la temporada de VRS (de octubre a marzo). A los bebés que nazcan fuera de la temporada VRS (de abril a septiembre), y tengan menos de 6 meses en octubre, se les inmunizará en su centro de salud, idealmente durante el mes de octubre.

Para más información consulte con su pediatra/enfermer@ de pediatría.

Además puede encontrar información en: <https://vacunasaep.org/documentos/prevencion-vrs-con-nirsevimab-preguntas-y-respuestas-para-profesionales-y-familias>

<https://www.andavac.es/stop-bronquiolitis/>

Grupo de Trabajo de VRS

Grupo Técnico en Vacunas de Canarias. Dirección General de Salud Pública